

PENDISTREP L.A.
COMBINACIÓN DE PENICILINAS LARGA ACCIÓN
CON ESTREPTOMICINA

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene	
Benzylpenicilina Procaínica	120 000 I.U.
Benzylpenicilina Benzatinica	80 000 I.U.
Dihydroestreptomicina sulfato	200 mg base



ESPECIES DE DESTINO:

Caballos, vacas, cerdos, ovejas, cabras, perros, gatos

INDICACIONES:

La penicilina muestra una marcada acción bactericida contra grampositivos, bacilos y anaerobios y también contra algunos gérmenes Gram- negativos (Actinobacillus , Haemophilus , Leptospiren , algunas cepas de Pasteurella , anaerobios como Bacteroides y Fusobacterium).

Dihidroestreptomicina es activo contra Gram -negativos y bacilos , y también contra algunas bacterias Gram-positivas (Staph. Aureus, Mycobacterium).

Prevención y tratamiento de las infecciones causadas por la penicilina G y / o DHS microorganismos susceptibles, como las infecciones del tracto respiratorio (fiebre del transporte , bronconeumonías , infecciones de las vías respiratorias superiores) , infecciones del tracto uro- genital (por ejemplo, pielonefritis por Corynebacterium renale , endometritis), infecciones de la piel y heridas , infecciones de estreptococos en caballos (estrangula , infecciones . Str. zooepidermicus en potros) , erisipela en cerdos , panadizo , necrobacilosis en terneros y lechones , infecciones anaerobias (infecciones clostridiales , el tétanos, ántrax), poliartritis (enfermedad del ombligo) , mastitis, septicemia , las infecciones bacterianas secundarias a las virales. En la prevención postoperatoria de infecciones.

DOSIS:

Bovinos:	5 -10 ml por cada 220 libras de peso
Equinos, cabras y ovejas:	5 ml por cada 110 libras de peso
Perros y gatos:	0,5 ml por cada 11 libras de peso
Repetir el tratamiento cada 5 a 7 días.	

PRESENTACIÓN:

Frasco por 100 ml