

**PENDISTREP 20/20**  
COMBINACIÓN DE PENICILINA CON ESTREPTOMICINA

**COMPOSICION:**

Cada ml contiene

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Penicilina G procaína             | 200.000 UI |
| Dihidroestreptomicina ( sulfato ) | 250 mg     |



**CARACTERISTICAS GENERALES:**

La asociación de penicilina con estreptomicina da lugar a un producto de amplio espectro, activo frente a gérmenes Gram positivos y Gram negativos, de gran actividad, ya que se trata de dos antibióticos bactericidas que se complementan perfectamente.

**INDICACIONES:**

En todos los procesos por gérmenes sensibles a la penicilina y dihidroestreptomicina y sobre todo en infecciones mixtas y procesos secundarios a virosis. En general, en septicemias hemorrágicas, colibacilosis, procesos supurados, neumonías y bronconeumonías, coriza, fiebre del embarque, metritis, tétanos, carbunco, cistitis, nefritis, pielonefritis.

**ESPECIES DE DESTINO:**

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

**DOSIS:**

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos y Cerdos: 6.000 a 12.000 UI de Penicilina G procaína más 6 a 12 mg de dihidroestreptomicina por kg de peso vivo por día

PRACTICA 1 ml por 44-66 Lb de peso. Intramuscular profunda

Durante 5 días como mínimo

**PRESENTACIONES:**

Frasco por 50 y 100 ml